

REAMBERIN®

Məhlulun tərkibi q/l-də :

Na cl	6,0 qr
K cl	0,3 qr
Mg cl	0,12 qr
Kəhrəba turşusu	15,0 qr
Inyeksiya üçün su	

Farmakoloji təsiri:

Reamberin-əsasını kəhrəba turşusu təşkil edən (N-metilammonium natrium suksinat) balanslaşdırılmış izotonik, kombine olunmuş təsirə malik infuzion məhluldur. Antihipoksik, antioksidant, membranoprotektor, dezintoksikasion təsirə malikdir. Kəhrəba turşusu karbohidrat, zülal və yağların biokimyəvi dəyişiklikləri zamanı yaranan aralıq metabolitlərdən biridir. Krebs tsiklində onun çevrilmələri enerji ayrılması ilə müşayiət olunur ki, bu da orqanizmdə hər bir hüceyrənin həyat fəaliyyəti üçün vacibdir.

Göstərişləri:

Cərrahiyyə və reanimasiya:

Poliorqan çatışmazlığı sindromu
Sepsis
Peritonit
Kəskin pankreatit
Mexaniki sarılıq
Qastroduodenal qanaxmalar
Pankreoduodenal rezeksiya
Aortakoronar şuntlama
Yanıqlar

Mamalıq və ginekologiya:

Doğuşdansonrakı endometrit
Ağır hestozlar

Nevrologiya:

- İşemik insultlar

Endokrin xəstəliklər:

Şəkərli diabetin ağırlaşmalarının profilaktika və müalicəsində
Diabetik pəncənin müalicəsində

İnfeksion xəstəliklər:

- Vərəm
- A,B və C hepatitləri
- Müxtəlif mənşəli bağırsaq infeksiyaları
- Qrip və ağırlaşmaları
- Pnevmoniya

Toksikologiya və narkologiya:

- Neyrotrop zəhərlərlə kəskin zəhərlənmələr
- Sirkə turşusu ilə zəhərlənmələr

Onkologiya:

- Kəskin intoksikasiyalı mexaniki sarılıq
- Hepatobiliar sistemin şişləri
-Şüa və polikimyavi terapiyanın intoksikasiya əlamətlərini götürmək əqsədilə

Dermatovenerologiya:

- Atopik dermatitlər
- Allergik dermatitlər

Pediatrica:

- Perinatal hipoksiya
- Kəskin bağırsaq infeksiyaları (intoksikasiya əlamətləri ilə)
- Dizenteriya
- Kəskin virus hepatitləri
- İrinli-septik xəstəliklər
- Uşaqlarda anesteziologiya məqsədilə

Qəbul qaydası və dozalanması:

Böyüklerde	400-800 ml\sutka
1 yaşından sonra uşaqlarda	10 ml\kq\sutka
Yenidoğulmuşlarda	5ml\kq\sutka

Böyüklerə REAMBERİN dəqiqədə 90 damcıdan artıq olmamaqla, 1 yaşdan etibarən uşaqlara gündə 1 dəfə dəqiqədə 3-4 ml sürətlə (sutkada 400 ml-dən çox olmamaqla) vena daxili damcı üsulu ilə yeridilir. Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq preparatın qəbulu 11 günə qədər davam edə bilər. **Əks göstərişləri:**

Preparatın komponentlərinə qarşı fərdi dözümsüzlük, böyrək və qaraciyər funksiyasının kəskin pozulması.

Buraxılış forması:

Flakon 200, 400 ml 1,5 %-li məhlul

İstehsalçı: Polisan, Rusiya.